

# Universo in Fiore 2019

## CORSO BASE

# I GIGANTI DEL COSMO: GLI AMMASSI DI GALASSIE

Sabrina De Grandi

INAF



Osservatorio  
Astronomico  
di

INAF

Brera

[sabrina.degrandi@inaf.it](mailto:sabrina.degrandi@inaf.it)



## Galassie




100 mila a.l.  
~30 kpc

## Gruppi



3 milioni a.l. ~  $10^6$  kpc


## Ammassi



20 milioni a.l. ~  $7 \times 10^6$  kpc




Fino agli anni '80:  
ispezione visuale di  
**lastre fotografiche**  
alla ricerca di  
sovradensita` di  
galassie.





I cataloghi di  
Abell (1958)  
e  
Zwicky (1961-1968)





Il catalogo piu` usato:  
Abell (1958)  
Emisfero Nord (2712)  
e  
A.C.O. (1989)  
Emisfero Sud (1364).



1958: Abell ispeziono`  
di  $104 \text{ deg}^2$  di lastre  
PSS (Luna  $\sim 0.25 \text{ deg}^2$ )

Criteri principali:

- almeno 30 galassie
- compatto ( $0.02 < z < 0.2$ )
- piano galattico escluso



Dagli anni '90:

- algoritmi automatici di identificazione al posto dell'occhio umano.
- **immagini digitali** (CCD)

Telescopio dedicato ad  
Apache Point 2.5m (US)





## Dagli anni '90:

- algoritmi automatici di identificazione al posto dell'occhio umano.
- **immagini digitali** (CCD)

- SDSS (Sloan Digital Sky Survey), iniziata nel 2000 e tutt'ora in atto (35% del cielo osservato, 500 milioni di oggetti, catalogo di ammassi
- Accesso libero ai dati (nel 2017: 15° Data Release, il prossimo sarà dic. 2019)

Telescopio dedicato ad  
Apache Point 2.5m (US)

Immagine SDSS  
dell'ammasso A2142







[Home](#) | [Help](#) | [Tutorial](#) |  
[Chart](#) | [List](#) | [Explore](#) |

### Parameters


|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| ra  | <input type="text" value="197.87292"/> deg  |
| dec | <input type="text" value="-1.3410884"/> deg |
| opt | <input type="text" value="GS"/>             |


**Get Image**



### Drawing options

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Grid                 |
| <input type="checkbox"/> Label                           |
| <input type="checkbox"/> Photometric objects             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Objects with spectra |
| <input type="checkbox"/> Invert Image                    |
| Advanced options                                         |
| <input type="checkbox"/> Spectroscopic Targets           |
| <input type="checkbox"/> Outlines                        |
| <input type="checkbox"/> Bounding Boxes                  |
| <input type="checkbox"/> Fields                          |
| <input type="checkbox"/> Masks                           |
| <input type="checkbox"/> Plates                          |





RXC J0032.1+1808

Dimensioni tipiche  
~ 20 milioni anni luce


ma...

Distanze tipiche  
~ miliardi di anni luce




# Esempio di MACS J1206.2-0847 $z=0.44$ (D~1800 Mpc)

SPICA ( $\alpha$  costellazione della Vergine)







Dove si trova la Via Lattea?

ovvero

Noi siamo in un  
Ammasso di galassie?




# Il Gruppo Locale

100.000 a.l.

1 Milione a.l.

Il nostro vicinato

← NOI SIAMO QUI: VIA LATTEA




# Il Super-Ammasso della Vergine





# Il Super-Ammasso Locale



Spazio  
**Laniakea, il "grande paradiso" cosmico che ci ospita**  
È una struttura larga cinquecento milioni di anni luce e che contiene centomila galassie. Gli astronomi ne hanno mappato i confini, ma è solo la punta dell'iceberg dell'immensa popolazione di oggetti sparsi nell'universo



4 settembre 2014

# The Laniakea supercluster of galaxies

R. Brent Tully, Hélène Courtois, Yehuda Hoffman & Daniel Pomarède

[Affiliations](#) | [Contributions](#) | [Corresponding author](#)

Nature 513, 71–73 (04 September 2014) | doi:10.1038/nature13674

Received: 07 April 2014 | Accepted: 07 July 2014 | Published online: 03 September 2014

**Focus.it**

ACCEDI

ABBONATI

[HOME](#) | [SCIENZA](#) | [SPAZIO](#)

## Laniakea, la nostra casa nell'Universo

La Via Lattea, il suo gruppo di galassie e altri 13 gruppi - miliardi e miliardi di stelle - formano Laniakea, l'Immenso Paradiso. E precipitano verso il Grande Attrattore. Ecco la nuova mappa dell'Universo.





# Nuova definizione del “Super-ammasso Locale” (basata sulla misura delle velocità peculiari)

COMA

SHAPLEY

Tully et al. 2014

II GRANDE ATTRATTORE  
(punto focale gravitazionale)


VIA LATTEA  
(al bordo di questa  
struttura enorme)

PERSEUS-PISCES


**LANIAKEA**

Asse Maggiore =  $520 \times 10^6$  ly (159 Mpc)  
300-500 ammassi di galassie (2MASS survey)






“Srotoliamo” la Volta Celeste






# La mappa del cielo





# Universo Locale ( $D < 200$ Mpc)



**2MASS (2 Micron All Sky Survey):**

osservate 1.6 milioni di galassie, rilevati centinaia (~500) di ammassi  
(Mt Hopkins, Arizona, Cerro Tololo Cile, 1997-2001)




A visualization of the cosmic web, showing a dense network of filaments and clusters of galaxies against a dark blue background. A large, irregular orange outline highlights a specific region of interest. Inside this region, a small red arrow points towards a cluster of galaxies.

Qual'è l'origine di Laniakea  
e di tutti  
gli ammassi di galassie  
che vediamo nell'Universo vicino ?


Dobbiamo tornare alla mappa del cielo

# Mappa del cielo






# Mappa del cielo




# Mappa del cielo






# Mappa del cielo




# Mappa del cielo





# Radiazione di Fondo Cosmica (2.7K)



# Radiazione di Fondo Cosmica (2.7K)


Contrast

Immagine dell'Universo quando aveva  
380mila anni, un attimo prima di  
diventare trasparente.

Universo Primordiale



Microwave





# Radiazione di Fondo Cosmica (2.7K)


Contrast

Immagine dell'Universo quando aveva  
380mila anni, un attimo prima di  
diventare trasparente.

Universo Primordiale



Microwave



# Radiazione di Fondo Cosmica (2.7K)

Contrast

Immagine dell'Universo quando aveva  
380mila anni, un attimo prima di  
diventare trasparente.

Universo Primordiale




Microwave

Aumentando il contrasto fino a 1 parte su 100 mila si iniziano a vedere le anisotropie del fondo a microonde da cui si sono formate le strutture cosmiche




Le variazioni della densita` locale oggi  
sono maggiori di quelle primordiali  
di molti ordini di grandezza!




La sfida delle **Cosmologia moderna**:  
comprendere come le PICCOLISSIME anisotropie del fondo  
nelle microonde si sono potute trasformare  
nelle ENORMI strutture odierne cosmologia moderna

$z = 20.0$




iSkysoft

50 Mpc/h





# Simulazione: dall'Eta` Oscura all'Eta` della Luce





Gli Ammassi di Galassie si formano nei NODI dei filamenti cosmici e sono le strutture piu` grandi nell'Universo tenute legate dalla forza di gravita`

125 Mpc/h

A visualization of the cosmic web, showing a dense network of filaments and nodes. The filaments are represented by thin, branching lines of purple and blue, while the nodes are represented by bright yellow and orange clusters of galaxies. A scale bar at the top center indicates a distance of 125 Mpc/h.

DI COSA SONO FATTI GLI AMMASSI?



# Ammasso di Galassie: nell'ottico

## **Galassie:**

Fatte di stelle (gas/polvere).

Visibili nell'ottico

Telescopi a Terra e nello spazio





**KECK-USA: 2 da 10 metri**



**VLT-ESO: 4 da 8 metri**




# Hubble Space Telescope






# Ammasso di Galassie: nell'ottico





10 arcmin

# Ammasso di Galassie: nei raggi X





10 arcmin

NGC 4889

NGC 4860

NGC 4858

NGC 4874

IC 4040

IC 4051

QSO

NGC 4921


NGC 4923 (7)

QSO


NGC 4911

NGC 4839

AGC 221162










Data di nascita dell'astronomia in banda X: **1962**  
con la scoperta della prima sorgente X (Scorpio X-1)  
**Premio Nobel per la Fisica: 2002 a R. Giacconi**

# Astronomia X oggi



Chandra &  
XMM-Newton  
0.1 – 10 keV



NuSTAR  
3–79 keV

Dal 1999 - 2 grandi telescopi X:  
XMM-Newton (ESA) e Chandra (NASA).



Chandra (X-ray)


A2199



DSS (Optical)

redshift,  $z$

A2029

A426-Perseus








**CALDISSIMO:**

**T=10-100 milioni di gradi**



**CALDISSIMO:**

**T=10-100 milioni di gradi**

**TENUISSIMO:**

**densita` ~ 0.1 atomi/cm<sup>3</sup>**



**Migliori Pompa a vuoto 100 atomi/cm<sup>3</sup>**



**CALDISSIMO:**




**T=10-100 milioni di gradi**

**TENUISSIMO:**

**densita` 0.1 atomi/cm<sup>3</sup>**

**COMPOSIZIONE CHIMICA:**

**H, He con tracce di altri elementi  
non primordiali, es. Fe, Si, O, S,....**




# La composizione chimica del Gas X ci dice che:

- Il gas è stato processato nelle stelle (unica fornace nota)
- Gli elementi sono stati prodotti da esplosioni di SN nelle galassie dell'ammasso
- Devono esistere dei meccanismi di trasporto degli elementi chimici dalle galassie al gas caldo X
- Meccanismi: venti stellari dalle galassie prodotti da SN, forze mareali/interazioni tra galassie, pressione d'ariete... (esistono osservazioni di questi fenomeni)



# Di cosa sono fatti gli ammassi?


Massa Galassie  $\sim 1\%$



# Di cosa sono fatti gli ammassi?

Massa Galassie  $\sim 1\%$

Gas intergalattico  $\sim 9\%$





# Di cosa sono fatti gli ammassi?

Massa Galassie  $\sim 1\%$

Gas intergalattico  $\sim 9\%$

Materia Oscura  $\sim 90\%$

$$\frac{M}{L} \sim 100-400 \frac{M_{\odot}}{L_{\odot}}$$



# Di cosa sono fatti gli ammassi?

**Fabiola Gianotti,  
Direttore Generale del CERN:**

**“Il fatto che il 95%  
dell’Universo sia Oscuro, cioè  
a noi sconosciuto, è una fonte  
di grande imbarazzo per gli  
scienziati odierni.**

**Tuttavia è anche molto  
eccitante: significa che ci sono  
ancora moltissime cose da  
scoprire.”**






# **Ammassi di Galassie : 2 grandi famiglie**


# Ammassi di Galassie : 2 grandi famiglie

A478 (raggi X)



“Rilassati”


COMA




“non-Rilassati”



# Ammassi di Galassie : 2 grandi famiglie




“Rilassati”





“non-Rilassati”

# Gli Ammassi di Galassie “Rilassati”





# Gli Ammassi di Galassie “Rilassati”



Abell 2029 – Galassia Centrale IC1101 (alone 6 milioni di al!)



Gli Ammassi “rilassati” hanno (sempre)  
una galassia Ellittica gigante nel centro.

BCG di Abell S740





# M87 – BCG dell'Ammasso della Vergine



NGC4696 –  
BCG dell'Ammasso del Centauro






# NGC 1275 – BCG dell'Ammasso del Perseo



# Come si formano le Galassie Centrali?

## Un caso di “cannibalismo” galattico





# Come si formano le Galassie Centrali?

## Un caso di “cannibalismo” galattico



Galassie più  
luminose e massicce  
dell' Universo

Aloni stellari di  
milioni di a.l.

Sono Diverse

- tracce di formazione stellare
- solo al centro degli ammassi
- tracce di cannibalismo (multi-nuclei, bande polvere..)

# Galassie Centrali Dominanti degli Ammassi

- Sono le Galassie piu` luminose e massive dell'Universo
- Hanno aloni stellari estesissimi (milioni di anni-luce)
- Sono diverse dalle altre Galassie Ellittiche
  - hanno ancora tracce di formazione stellare
  - stanno in posti speciali (al centro degli ammassi)
  - sono complesse (nuclei multipli, polvere, aloni..)
  - sono allineate con l'emissione X degli ammassi ospitanti
- Si formano per cannibalismo galattico
- Ospitano i BH supermassicci (spesso AGN radio)




... contengono i SMBH piu` grandi




# Hydra A: un ammasso “Rilassato”

ottico




raggi X






# Cavita` nel gas caldo (osservato in X)




Hydra-A  
Gas (Raggi X - blu)




Galassie (Ottico - bianco)  
Getti di Particelle (Radio - rosso)

# Cavita` nel gas caldo (osservato in X)

MS0735.6+7421



HGC62






Cavita` X e Getti Radio sono prodotti da un  
Nucleo Galattico Attivo (AGN):



La materia che “nutre”  
il SMBH induce  
potentissimi getti



# Attività dell'AGN centrale della galassia Centaurus A







# Perseo: l'ammasso più brillante in X



ottico



# Perseo: l' Ammasso piu` brillante in X






# Il centro dell'Ammasso del Perseo

CHANDRA X-RAY


Gas X

Getti Radio

VLA RADIO




Simulazione dell' interazione tra un SMBH  
nella BCG (AGN) e il gas X dell'ammasso






# Onde sonore negli ammassi?

L'espansione delle bolle può produrre onde sonore nel gas che trasportano l'energia prodotta dall'AGN a tutto il gas



CHANDRA X-RAY [3-COLOR]



**Cavita' X** CHANDRA X-RAY [SOUND WAVES]



# Lenti Gravitazionali



"Smiley" – Ammasso di galassie SDSS J1038+4849



# Lenti Gravitazionali

Abell 2218






# Lenti Gravitazionali

Abell 370





# Lenti Gravitazionali
















Visible Light  
*Hubble/ACS*



Near-Infrared  
*Hubble/ACS*




Infrared Light  
*Hubble/NICMOS*






Abell 2744 HFF  
Pandora








SPT0615-JD esisteva quando l'Universo aveva soltanto 500 milioni di anni (13,3 miliardi di anni fa).




**Gravitational Lens**  
**Galaxy Cluster 0024+1654**  
Hubble Space Telescope • WFPC2



analisi recente svela 33 immagini di 11 galassie lontane



A1689: ottico/X





# A1689: Ricostruzione di massa con lenti




Le Masse degli Ammassi  
misurate con  
metodi indipendenti  
sono consistenti tra loro  
(cioè danno la stessa quantità  
di Materia Oscura).

# **Ammassi di Galassie “non-Rilassati”**



# Ammassi di Galassie “non-Rilassati”

raggi X



cioe` ammassi di galassie in interazione

# Ammassi di Galassie “non-Rilassati” o meglio..... “Scontri tra Titani”





# Uno scontro molto particolare

1E 0657-156: Ammasso “Pallottola”



Gas X

# Uno scontro molto particolare

## 1E 0657-156: Ammasso “Pallottola”



“Pallottola”: è la parte di gas più interna e densa dell’ammasso che ha attraversato a velocità supersonica l’altro ammasso.



**SHOCK:**  
prodotto da un’onda nel gas che si muove a velocità maggiore della velocità del suono.




Quanta energia e` coinvolta in questa collisione?  
L'energia cinetica prodotta nello scontro e` pari a  
quella di circa  $10^{50}$  bombe atomiche



Sono gli eventi che producono piu` energia  
nell' Universo dopo il BigBang

# 1E 0657-156: l'Ammasso “Pallottola”

La “Smoking Gun” (prova provata) della Materia Oscura





# 1E 0657-156: l'Ammasso “Pallottola”

## La “Smoking Gun” (prova provata) della Materia Oscura


Galassie (OTTICO) + **Materia Oscura (lenti gravitazionali)**

**Materia  
Oscura**



# 1E 0657-156: l'Ammasso “Pallottola”


La “Smoking Gun” (prova provata) della Materia Oscura



La collisione titanica ha separato la Materia Oscura dalla materia ordinaria (gas)



# 1E 0657-156: Ammasso “Pallottola”




Simulazione

# MACS J0025.4-1222: un altro esempio di collisione che ha separato la DM dalla materia ordinaria

Gas (raggi X)

Materia Oscura

Galassie (OTTICO)





# A2744: Ammasso Pandora




Immagine composita:  
Galassie, Gas X (rosso), DM (blu)  
Collisione tra almeno 4 ammassi



I Giganti del Cosmo

*GRAZIE*